

Chirurgische Händedesinfektion

Wann?

- vor dem direktem Kontakt zum OP-Feld und zu sterilen Medizinprodukten oder Materialien
- vor sonstigen Eingriffen mit gleichen Anforderungen an die Asepsis

Wie?



Händewaschen einmalig am OP-Tag bzw. bei sichtbarer Verschmutzung, mindestens 10 Minuten vor der chirurgischen Hände-Desinfektion.



Hände-Desinfektionsmittel in die trockene hohle Hand geben (Spenderbetätigung mit dem Ellenbogen).



Einwirkzeit: 1,5 Minuten. Hände und Unterarme während der Einwirkzeit feucht halten, ggf. mehrmals Hände-Desinfektionsmittel entnehmen.



Durchführung:

Hände und Unterarme benetzen.

- 10 Sekunden Einreiben der Hände
- 10 Sekunden Einreiben der Unterarme
- 70 Sekunden sorgfältiges Einreiben der Hände mit besonderem Augenmerk auf Fingerspitzen und Daumen



Vor dem Anlegen der OP-Handschuhe müssen die Hände lufttrocken sein.

Quelle:

KRINKO (2016) Bundesgesundheitsbl 59:1189–1220.



Wir forschen für
den Infektionsschutz
hartmann-science-center.de

Gemeinsam für mehr Sicherheit –
mit guter Händehygiene!

Internationaler Tag
der Händehygiene
5.5.2022



#GemeinsamStarkGegenKeime #MissionInfectionPrevention